

IMPFUNGEN	6 WO	2 MO	3 MO	4 MO	11* MO	12 MO	15 MO	5-6 J	7-8 J	9-14 J	15-16 J	17 J	AB 18 J	AB 60 L
Rotavirus SI L	G1^a		G2	(G3)										
Tetanus ^b	G1 6-fach Impfung	N	G2 6-fach Impfung	G3^c 6-fach Impfung	N	N	A1	N	A2	N	A (alle 10 Jahre) ^e	N	A (alle 10 Jahre) ^e	
Diphtherie ^b														
Pertussis ^b														
HIB ^b														
Poliomyelitis ^b														
Hepatitis B ^b														
Pneumokokken ^b	G1	N	G2	G3^c	N									S^g
Meningitis (Serogruppe C)					G1				N					
Mumps L					G1									
Masern L							G2							S^f
Röteln L														
Varizellen (Windpocken) L					G1									
HPV (Humane Papillomavirus)										G1+G2^d	N			
Herpes Zoster														G1,2^h
Influenza														S jährlich

SI = Schluckimpfung

L = Lebendimpfung

G = Grundimmunisierung

N = Nachimpfung

A = Auffrischimpfung

S = Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

c Mindestzeitraum zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich.

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff

h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes Zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden