

IMPFUNGEN	6 WO	2 MO	3 MO	4 MO	11* MO	12 MO	15 MO	5-6 J	7-8 J	9-11 J	12-14 J	15-16 J	AB 18 J	AB 60 L	AB 75		
Rotavirus SI L	G1 ^a		G2	(G3)													
Tetanus ^b	G1 6-fach Impfung		N	G2 6-fach Impfung	G3 ^c 6-fach Impfung	N		A1		A2		A (alle 10 Jahre) ^e					
Diphtherie ^b			N			A1		A2		A (alle 10 Jahre) ^e							
Pertussis ^b			N			A1		A2		A3 ^e							
HIB ^b			N														
Poliomyelitis ^b			N			N				A1							
Hepatitis B ^b			N			N											
Pneumokokken ^b	G1	N	G2	G3 ^c	N									S ^g			
Meningokokken Typ B	G1		G2		G3												
Meningokokken ACWY											G1						
Mumps L					G1			G2									
Masern L										S ^f							
Röteln L																	
Varizellen (Windpocken) L					G1												
HPV (Humane Papillomavirus)											N						
Herpes Zoster														G1 + G2 ^h			
Influenza														S ^k			
Covid-19													G1+G2+G3 ⁱ	S ^k			
RSV	monoklonale Antikörper (Einmaldosis) ^k														S ^j		
SI = Schluckimpfung	* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen c Mindestzeitraum zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich. e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung. f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus,ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes Zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten i Impfabstände entsprechend Fachinformation beachten (zwischen G1 und G2 sowie G2 und A1) j Jährliche Impfung im Herbst k Bei Neugeborenen (geb.April-September): Impfung im Herbst des Geburtsjahres. Bei Neugeborenen (geb. Oktober-März: Impfung 3. - 10. Lebenstag l RSV (Impfung): 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison																
L = Lebendimpfung																	
G = Grundimmunisierung																	
N = Nachimpfung																	
A = Auffrischimpfung																	
S = Standardimpfung																	